

Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály

Beteg neve: **TAJ:** **Dátum:**

	<i>0 PONT</i>	<i>1 PONT</i>	<i>2 PONT</i>	<i>PONTSZÁM</i>
Életkor (év)	18-35	35-40	>40	
Testtömeg index (BMI: testsúly (kg) / testmagasság ² (m))	<30	30-35	>35	
Családi anamnézis	negatív/kivizsgált	PE/MVT	-	
Anamnézis	negatív	MVT	VT atípusos helyen	
Varicositas (nem seprűvéna – nagyfokú, térd felett)	nincs	van	-	
Kóros terhesség	nincs	GDM/GHT	preeclampsia	
Trombophilia	nincs	-	igazolt	
Kísérbetegségek	nincs	IDDM, HT	autoimmun/nephrosis	
Immobilizálás ≥ 3 nap	nincs	-	igen	
Ikerterhesség	nincs	igen	-	
≥ 4. szülés	nincs	igen	-	
Várandóság alatti összpontszám				
Szülés módja	-	-	császármetszés	
Vérvesztés	átlagos	500-1000ml	>1000ml	
Halva szülés	-	-	igen	
Szülés utáni összpontszám				

Javaslat az alkalmazandó megelőzésre:

- ❖ 0–3 pont – Korai mobilizálás
- ❖ 4-7 pont – Korai mobilizálás, LMWH sc. 10 napig
- ❖ 8 pont felett - Korai mobilizálás, LMWH sc. 6 hétig

Császármetszést követően alacsony kockázat esetén is LMWH (0,4 ml Clexane) adandó sc. a bent fekvés ideje alatt!

Mennyiség: <90kg – 0,4ml Clexane, 90-120 kg – 0,6ml Clexane, >120kg - 0,8 ml Clexane

Mikor: szülés után 6-12 órával sc. minden esetben, időtartama a pontszám alapján

.....
Értékelést végző aláírása